

# FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES ADYACENTES



Instituto de Ecología A.C.  
Centro Regional del Bajío  
Pátzcuaro, Michoacán, México  
en colaboración con



1993

La Flora del Bajío y de regiones adyacentes pretende ser básicamente un inventario de las especies de plantas vasculares que crecen en forma silvestre en los estados de Guanajuato, de Querétaro y en la parte septentrional de Michoacán. En este último quedan incluidas las áreas ubicadas al este del paralelo 102° 10' W y al norte del parteaguas de la cuenca del río Balsas.

La Flora será un esfuerzo cooperativo, crítico, coordinado por el Instituto de Ecología, en el que participarán investigadores del mismo, así como de otros organismos nacionales y algunos extranjeros.

La Flora se editará en forma de fascículos sin secuencia preestablecida. Cada fascículo corresponderá en principio a una familia. Además, se editará una serie paralela de fascículos complementarios, que darán cabida a temas ligados al universo vegetal del área, pero que no serán propiamente contribuciones taxonómicas.

Editores: Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón de Rzedowski.

Producción Editorial: Rosa Ma. Murillo.

Toda correspondencia referente a la adquisición de fascículos debe dirigirse a:

Instituto de Ecología A.C.  
Departamento de Publicaciones  
Apdo. Postal 63  
91000 Xalapa, Veracruz

ISSN 0188-5170

**HYMENOPHYLLACEAE\***

Por Leticia Pacheco\*\*

Universidad Autónoma Metropolitana  
Unidad Iztapalapa  
México, D. F.

Plantas epífitas, algunas veces hemiepífitas, terrestres o epipétricas, herbáceas, delicadas, diminutas o hasta de tamaño medio; rizoma rastrero con hojas distantes, o a veces semierecto, firme y con hojas fasciculadas, provistas de tricomas simples, pardos claros, rojizos o negruzcos; hojas monomorfas, a veces dimorfas, no articuladas, de vernación circinada, lámina entera a varias veces pinnada, glabra a pubescente, raras veces con escamas, tejido de la lámina de una célula de grueso, sin estomas, venación anádroma, catádroma o flabelada, venas libres, a veces venas falsas presentes; soros marginales, terminales en las venas, involucre inmerso a exserto y entonces ligeramente pedunculado, bivalvado o tubular, receptáculo corto y rudimentario, filiforme a cilíndrico grueso o estrechamente turbinado, inserto o exserto en la madurez; esporangios sésiles sobre el receptáculo, con anillo oblicuo no interrumpido; esporas tetrahédricas a subglobosas, triletes, generalmente verdosas.

Familia con aproximadamente 600 especies de distribución principalmente pantropical, con unas pocas extendiéndose a las regiones templadas.

Para esta Flora se adopta un criterio conservador y tradicional, reconociendo sólo dos géneros, pero el número de acuerdo con diferentes autores varía, siendo hasta de 42.

- 1 Involucro bivalvado; receptáculo que generalmente no se prolonga más allá del borde del involucro ..... *Hymenophyllum*
- 1 Involucro tubular, a veces bilabiado pero no bivalvado; receptáculo que se prolonga más allá del borde del involucro ..... *Trichomanes*

\* Referencias: Pacheco, L. & R. Riba. Hymenophyllaceae. In: Flora de Veracruz. Fascículo 63. Instituto de Ecología, A. C. & University of California. México. 54 pp. 1991.

\*\* Trabajo realizado con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

## HYMENOPHYLLUM Smith

Epífitas, rara vez terrestres; rizoma largamente rastrero, con pelos pardos a rojizos; hojas de 0.8 a 62 cm de largo, monomorfas, (en ocasiones parcialmente dimorfas), distantes, simples, 1-lobadas a varias veces divididas, determinadas o indeterminadas, corta a largamente pecioladas, pecíolo delicado, firme, rollizo, generalmente más corto que la lámina, sin alas o alado, glabro a pubescente, lámina linear a subflabelada, glabra a pubescente, los tricomas simples, bifurcados o estrellados, últimos segmentos con el margen entero a aserrado, venación libre, anádroma, generalmente pinnada o subflabelada, sin venas falsas, a veces con alas sobre las venas; involucre parcialmente inserto a ligeramente pedunculado, bivalvado, suborbicular a elíptico u obovado, receptáculo filiforme a engrosado, cilíndrico a angostamente turbinado, rudimentario o corto hasta algo exserto en la madurez.


Género con aproximadamente 300 especies, del Viejo y Nuevo Mundo.

Son plantas de ambientes muy húmedos y sombríos. Para el área de estudio sólo se registra una especie.


**Hymenophyllum tunbridgense** (L.) J. Sm., Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 418. 1793. *Trichomanes tunbridgense* L., Sp. Pl. 1098. 1753.

Epífita; rizoma de 0.2 mm de diámetro, rastrero, ferrugíneo, con pelos rojizos a pardos, aplanados, septados; hojas de 3.5 a 7.5 cm de largo y 1.1 a 1.7 cm de ancho, distantes, arqueadas, péndulas, determinadas, pecíolo de 8 a 20 mm de largo y 0.2 a 0.3 mm de ancho, rollizo, pardo-rojizo, glabro, no alado, lámina de 2.9 a 5.7 cm de largo, ovado-lanceolada a linear-lanceolada, ápice pinnatífido, base truncada, 2-3-pinnatífida, glabra, a veces con pelos diminutos sobre las venas, verde a parda al secar, membranosa, raquis pardo, glabro, alado, ala de 0.1 mm de ancho, pinnas 6 a 14 pares, de 7 a 9 mm de largo y 4 a 6 mm de ancho, 1-2- pinnatífidas, flabeladas, ovadas o truladas, ápice redondeado, pediculadas a suavemente adnadas por la base decurrente, ascendentes, esparcidas, pinnas inferiores casi del mismo tamaño que las de la parte media, últimos segmentos de 2 a 3 mm de largo y 0.8 a 0.9 mm de ancho, lineares, ápice serrulado, redondeado, margen serrulado, glabros, venas bifurcadas, no aladas; soros en la axila o en el lado acroscópico de la pinna, 1 a 3 por pinna, 1 por segmento, involucre de 1.5 a 2 mm de largo y 1 a 1.5 mm de ancho, libre, ovado, campanulado, no en ángulo con el plano de la lámina, ápice agudo a redondeado, base arqueada y algo pedunculada, cuneada, margen entero, receptáculo inserto a exserto, esporangios 6 a 36 por soro.

Planta escasa en la zona de estudio, sólo se ha recolectado en cañadas, sobre peñas en bosque de *Cupressus*, pino y encino y en bosque mesófilo de montaña. Alt. 1600-2000 m.



*Hymenophyllum tunbridgense* (L.) Smith. A. hábito; B. detalle de los involucros; C. detalle de un involucro; D. detalle de un involucro mostrando los esporangios. Ilustrado por Alfonso Barbosa



E.U.A.; Chih., Qro., Hgo., Pue., Ver., Oax., Chis.; Centroamérica; Sudamérica; las Antillas; Europa occidental; África; Australia y Nueva Zelanda. (Tipo incierto, los ejemplares LINN-1253.4 y 1253.5 pertenecen a esta especie, pero no es seguro que hayan servido de base para la descripción original).

Muy localizada y en consecuencia amenazada de extinción en Querétaro, aunque se registra como común en otras partes de su área de distribución.

**Querétaro:** Cañada de las Avispas, al SE de San Juan de los Durán, municipio de Jalpan, *H. Díaz B. & E. Carranza 6562* (IEB); *ibid.*, *H. Rubio 1490* (IEB).

Díaz Barriga y Palacios-Rios\* citan esta planta de Querétaro bajo el nombre

\* Díaz Barriga, H. & M. Palacios-Rios. Listado preliminar de especies de pteridofitas de los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. In: Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes. Fascículo complementario III. Instituto de Ecología, A. C., Centro Regional del Bajío. Pátzcuaro, Michoacán, México. 57 pp. 1992.

de *H. ectocarpon* Fée (= *H. fucooides* (Sw.) Sw.), con la que se suele confundir, sin embargo, se pueden diferenciar en que *H. ectocarpon* presenta los últimos segmentos de las pinnas de 1 a 1.5 mm de ancho, el raquis con escasos pelos septados, pajizos a pardos, el involucro en el mismo plano de la lámina, a diferencia de *H. tunbridgense*, cuyos últimos segmentos de las pinnas son de 0.8 a 0.9 mm de ancho, el raquis glabro y el involucro no en el mismo plano de la lámina.

A menudo *H. tunbridgense* crece mezclada con *H. polyanthos* (Sw.) Sw., por lo que se sospecha su presencia en Querétaro. La última se distingue fácilmente porque los segmentos de las pinnas tienen el margen entero, los involucros son ovados, elípticos o lanceolados con el ápice agudito y la base cuneada, no constreñida ni pedunculada y en *H. tunbridgense* los segmentos tienen el margen serrulado, los involucros son ovados o campanulados, el ápice agudo a redondeado, la base arqueada y algo pedunculada.

### TRICHOMANES L.


Epífitas, hemiepífitas, terrestres o epipébricas; rizoma rastrero, a veces semierecto, con hojas fasciculadas o más comúnmente espaciadas, provistas de tricomas pardos a negruzcos; hojas de 0.2 a 86 cm de largo, monomorfas, a veces dimorfas, simples a 4-pinnado-pinnatífidas, subsésiles a largamente pecioladas, pecíolo delicado a grueso, aplanado, rollizo, a veces redondeado-trígono, en pocas especies sulcado en el lado adaxial, comúnmente más corto que la lámina, a veces alado todo o en una parte de su longitud, lámina suborbicular a lanceolada o subdeltoide, glabra a pubescente, los tricomas simples, bifurcados o estrellados, venación pinnada, catádroma, anádroma o flabelada, venas libres, a veces con venas falsas paralelas o perpendiculares a las venas verdaderas; involucro inserto a exserto, tubular, estrechamente cilíndrico a urceolado, truncado y entero a bilabiado, receptáculo filiforme, exserto en la madurez.

Aproximadamente 300 especies, en los trópicos y subtrópicos del mundo.

Son plantas generalmente epífitas, aunque también se les puede encontrar como terrestres y epipébricas de lugares muy húmedos y oscuros. En el área de estudio sólo se encuentra una especie.


***Trichomanes radicans* Sw., J. Bot. (Schrader) 1800(2): 97 "1801" (1802).**

Epífita o epipétrica; rizoma de 1 a 2 mm de diámetro, largamente rastrero, verde a pardo, con abundante pubescencia hirsuta corta y parda o con pelos septados y pardos; hojas de 11.8 a 62 cm de largo y 2.4 a 21 cm de ancho, monomorfas, casi sésiles o con pecíolo de 1.2 a 17.2 cm de largo y 0.01 a 0.20 cm de ancho, rollizo a subrollizo en la base y haciéndose aplanado hacia el ápice, a veces con un canal central en el lado adaxial, verde, amarillento a pardo oscuro, con pelos similares a los del rizoma que se presentan también en el raquis y sobre las venas en la base de las



*Trichomanes radicans* Sw. A. pinna; B. involucre. Ilustrado por Manuel Escamilla y reproducido del fascículo 63 de la Flora de Veracruz.

pinnas, no alado o con alas de 0.1 a 0.5 mm de ancho, verdes a parduscas, lámina de 9.6 a 50 cm de largo, firme-membranácea, 2-pinnado-pinnatífida a 4-pinnatífida, trulada, deltoidea, lanceolada, oblonga, linear-lanceolada, oblongo-lanceolada u ovado-lanceolada, ápice pinnatífido, base a veces ligeramente reducida, raquis alado, pinnas 7 a 32 pares, de 3 a 15.4 cm de largo, alternas, pediceladas, lanceoladas u ovado-lanceoladas, ápice pinnatífido, base inequilátera, ascendentes, pinnas inferiores a veces más pequeñas que las de la parte media, últimos segmentos lineares a linear-oblongos, ápice redondeado, emarginado, agudito, margen entero y plano, venación abierta, anádroma, pinnada, venas varias veces bifurcadas, venas falsas ausentes; células pequeñas y no translúcidas; soros terminales en los extremos de las venas de las pínulas, 3 a 48 por pinna, involucre de 1 a 3 mm de largo y 0.5 a 0.8 mm de ancho, libre o escasamente inmerso en el tejido, infundibuliforme a es-



trechamente cilíndrico, truncado, si acaso escasamente bilabiado, la boca rara vez abierta, margen sin células oscuras, receptáculo largamente exserto; esporangios numerosos.

Planta epífita en cañadas, laderas de cerros, a la orilla de arroyos, en bosques de encino y *Liquidambar*, bosques mesófilos de montaña. Escasa en el área de estudio. Alt. 900-1400 m.

Chih., S. L. P., Jal., Qro., Hgo., Mich., Mor., Pue., Ver., Gro., Oax., Chis.; Centroamérica; Sudamérica; las Antillas (tipo procedente de Jamaica: *O. Swartz s. n.* (holotipo: foto C! ex S)); Antiguo Mundo.

De presencia muy ocasional, por consiguiente vulnerable a la extinción en el perímetro de esta Flora. Se conoce sin embargo, como mucho más común en otros segmentos de su área de distribución.

**Querétaro:** El Carrizal, 1 km al NE de El Pemoche, municipio de Landa, *H. Rubio 391* (ENCB, IEB); 2 km al SE de El Naranjo, municipio de Landa, *H. Rubio 1463* (IEB, UAMIZ).

**Michoacán:** 1.5 km al E de Yerbabuena, sobre el camino a Laguna Larga, municipio de Zinapécuaro, *J. Rzedowski 46274* (EBUM, IEB).

Esta especie con frecuencia se confunde con *T. collariatum* Bosch (de Ver., Oax., Tab. y Chis.), pero se pueden distinguir porque *T. collariatum* presenta la lámina linear-oblonga u oblongo-lanceolada, pinnas oblongas, patentes, involucros claramente bilabiados y los labios muy abiertos.

## ESPECIE EXCLUIDA

Díaz Barriga y Palacios-Rios (op. cit.) citan para el estado de Michoacán a *Trichomanes pinnatum* Hedw., con base en la colecta *E. Langlassé 672*, sin localidad precisa, de acuerdo con las mencionadas autoras. Sin embargo, según la información proporcionada por McVaugh\*, dicho ejemplar fue recolectado en el Cerro Mamegal, en el estado de Guerrero.

---

\* McVaugh, R. The travels and botanical collections of Eugene Langlassé in México and Colombia. 1898-1899. *Candollea* 13: 167-211. 1951.

## ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOMBRES DE PLANTAS

*Cupressus*, 2

encino, 2, 8

Hymenophyllaceae, 1

*Hymenophyllum*, 1, 2

*H. ectocarpon*, 5

*H. fucoides*, 5

*H. polyanthos*, 5

*H. tunbridgense*, 2, 3, 4, 5

*Liquidambar*, 8

pino, 2

*Trichomanes*, 1, 5

*T. collariatum*, 8

*T. pinnatum*, 8

*T. radicans*, 5, 6, 7


*T. tunbridgense*, 2

## MUNICIPIOS DE GUANAJUATO    MUNICIPIOS DE QUERÉTARO    MUNICIPIOS DE MICHOACÁN

32 Abasolo  
 43 Acámbaro  
 30 Apaseo El Alto  
 29 Apaseo El Grande  
 7 Atarjea  
 28 Celaya  
 27 Comonfort  
 45 Coroneo  
 36 Cortazar  
 21 Cuerámara  
 14 Doctor Mora  
 11 Dolores Hidalgo  
 10 Guanajuato  
 33 Huanímara  
 22 Irapuato  
 35 Jaral del Progreso  
 44 Jerécuara  
 25 Juventino Rosas  
 8 León  
 19 Manuel Doblado  
 38 Moroleón  
 1 Ocampo  
 31 Pénjamo  
 23 Pueblo Nuevo  
 17 Purísima del Rincón  
 20 Romita  
 24 Salamanca  
 41 Salvatierra  
 3 San Diego de la Unión  
 2 San Felipe  
 18 San Francisco del Rincón  
 13 San José Iturbide  
 4 San Luis de la Paz  
 12 San Miguel de Allende  
 16 Santa Catarina  
 40 Santiago Maravatío  
 9 Silao  
 46 Tarandacuao  
 42 Tarimoro  
 15 Tierra Blanca  
 39 Uriangato  
 34 Valle de Santiago  
 5 Victoria  
 26 Villagrán  
 6 Xichú  
 37 Yuriria

18 Amealco  
 1 Arroyo Seco  
 11 Cadereyta  
 9 Colón  
 8 El Marqués  
 12 Ezequiel Montes  
 15 Huimilpan  
 2 Jalpan  
 3 Landa  
 16 Pedro Escobedo  
 4 Peñamiller  
 5 Pinal de Amoles  
 7 Querétaro  
 6 San Joaquín  
 17 San Juan del Río  
 13 Tequisquiapan  
 10 Tolimán  
 14 Villa Corregidora

53 Acuitzio  
 24 Álvaro Obregón  
 9 Angamacutiro  
 32 Angangueo  
 36 Coeneo  
 28 Contepec  
 21 Copándaro de Galeana  
 22 Cuitzeo  
 40 Charo  
 34 Cherán  
 33 Chilchota  
 19 Chucándiro  
 6 Churintzio  
 5 Ecuandureo  
 27 Epitacio Huerta  
 47 Erongarícuaro  
 20 Huandacareo  
 18 Huaniqueo  
 51 Huiramba  
 41 Indaparapeo  
 29 Irimbo  
 2 La Piedad  
 50 Lagunillas  
 26 Maravatío  
 38 Morelia  
 44 Nahuatzen  
 3 Numarán  
 10 Panindícuaro  
 43 Paracho  
 49 Pátzcuaro  
 8 Penjamillo  
 15 Purépero  
 11 Puruándiro  
 42 Queréndaro  
 37 Quiroga  
 23 Santa Ana Maya  
 52 Santa Clara del Cobre  
 30 Senguio  
 4 Sixto Verduzco  
 14 Tangancícuaro  
 39 Tarímbaro  
 46 Tingambato  
 31 Tlalpujagua  
 13 Tlazazalca  
 48 Tzintzuntzan  
 45 Uruapan  
 16 Villa Jiménez  
 17 Villa Morelos  
 1 Yurécuaro  
 35 Zacapu  
 12 Zamora  
 7 Zináparo  
 25 Zinapécuaro



## FASCICULOS PUBLICADOS

1. Familia Papaveraceae. G. Calderón de Rzedowski.
2. Familia Cistaceae. G. Calderón de Rzedowski.
3. Familia Burseraceae. J. Rzedowski y F. Guevara-Féfer.
4. Familia Taxodiaceae. E. Carranza.
5. Familia Coriariaceae. G. Calderón de Rzedowski.
6. Familia Linaceae. J. Rzedowski y G. Calderón de Rzedowski.
7. Familia Loasaceae. G. Calderón de Rzedowski.
8. Familia Cornaceae. Eleazar Carranza G.
9. Familia Taxaceae. S. Zamudio.
10. Familia Melastomataceae. F. Almeda.
11. Familia Meliaceae. G. Calderón de Rzedowski y M. T. Germán.
12. Familia Osmundaceae. M. Palacios-Rios.
13. Familia Marattiaceae. M. Palacio-Rios.

## Complementarios

- I. Presentación. Guía para los autores y normas editoriales.
- II. Listado florístico preliminar del estado de Querétaro. E. Argüelles, R. Fernández y S. Zamudio.
- III. Listado preliminar de especies de pteridofitas de los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro. H. Díaz Barriga y M. Palacios-Rios.

Este fascículo se publica gracias al apoyo económico recibido de:

- el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
- la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo;
- la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad;
- el Sr. Walter L. Meagher